

Resum Hasil Aplikasi POC Bloton Pada berbagai Tanaman

No,	Nama	Komoditi	Kenaikan dg Bioton
1.	Pusmalang, Pakem Yogyakarta	Padi Mentimun Kacang panjang	40% dari biasanya dan panen lebih cepat 1 (satu) minggu 25%-40% dari biasanya panen lebih cepat 1 (satu) minggu dan tanaman terus berbuah. Apabila terlambat panen besar buah rata-rata sebesar labu. 3 (tiga) musim berturut-turut ditanami kacang tanpa sela dan hasil rata-rata tetap meningkat 40%. Panjang kacang rata-rata 1 (satu) meter.
2.	Kauman Parakan, Temanggung	Nilam Tembakau Kol/Kobis Kacang Kara	Pertumbuhan tanaman nampak lebih sehat dan bau/aroma lebih harum Daun lebih lebar, pertumbuhan cepat, namun perlu diperhatikan jarak tanam Tanaman lebih tahan terhadap hama penyakit dan lingkungan yang kurang baik. Kualitas kol lebih baik/harga lebih tinggi. Berat rata-rata meningkat. Peningkatan hasil sekitar 30%-40% Masa berbuah lebih cepat sekitar 1 (satu) minggu dan buah lebih lebat. Tanah menjadi remah
3.	Semarang	Cabai Hot Beauti & keriting Cabai rawit Kacang Tanah Sengon, Jati Emas	Hasil buah meningkat, Warna cabai hot beauti orange segar, Panen lebih cepat 1 (satu) minggu Panen lebih cepat 1 (satu) minggu. Apabila terlambat panen, besar buah jadi diluar ukuran Tanaman terlihat lebih sehat, kokoh dan daun lebih lebar. Buah rata-rata diatas 32 per rumpun.l Pertumbuhan cepat sekali pada saat pembibitan dan kematian dapat ditekan. Jumlah bintil akar rata-rata diatas 16. Penggunaan Bioton sangat bermanfaat pada

		<i>Kedelai Idamami</i>	<i>umur 1-3 bulan Dengan perlakuan khusus pada percobaan polybag, tinggi tanaman mencapai 2 (dua) meter dan buah lebat pada setiap ruas Kualitas buah jauh lebih baik. Pada percobaan khusus tinggi tanaman mampu mencapai 3 (tiga) meter dan hasil buah meningkat 15%.</i>
4.	<i>Pekantingan, Cirebon</i>	<i>Terong</i>	<i>Sebelum menggunakan Bioton biasanya panen diperoleh hasil 16 Kg/pohon, setelah menggunakan Bioton hasil yang diperoleh mencapai 36 Kg per pohon. Kenaikan produksi yang diperoleh 300% dari biasanya.</i>
5.	<i>Pekantingan-Cirebon</i>	<i>Mentimun</i>	<i>Sebelum menggunakan Bioton biasanya hanya 20 kali petik namun setelah menggunakan Bioton mampu 30 kali petik. Peningkatan produksi yang diperoleh sebesar 50%</i>
6.	<i>Pekantingan-Cirebon</i>	<i>Kacang Panjang</i>	<i>Biasanya panen kacang panjang 4,66 ton per hektar tetapi setelah menggunakan Bioton diperoleh hasil 7,5 ton per hektarnya. Tampilan buah lebih baik dan panjang kacang rata-rata 1 meter - 1,3 meter padahal biasanya hanya sekitar 80 cm.</i>
7.	<i>Cirebon</i>	<i>Kacang Hijau</i>	<i>Sebelum menggunakan Bioton biasanya panen hanya mencapai 1,5 ton per Ha namun setelah menggunakan Bioton hasil yang diperoleh mampu mencapai 2,1 ton per hektarnya</i>
8.	<i>Pamuragan-Cirebon</i>	<i>Kedele</i>	<i>Sebelum menggunakan Bioton hasil yang dicapai sekitar 1,8 ton per hektar, namun setelah menggunakan Bioton bisa mencapai 2,3 ton per hektar. Baru kali ini ada PPC yang benar-benar bagus</i>
9.	<i>Indramayu</i>	<i>Padi</i>	<i>Biasanya dengan jenis padi yang sama hanya mencapai 4,2 ton per hektarnya, namun diluar dugaan saya menggunakan Bioton hasilnya mencapai 8,7 ton per hektar</i>

10.	Pamuragan-Cirebon	Padi	Menggunakan Bioton sejak lama dan telah merasakan hasilnya. Sebelum menggunakan Bioton biasanya hanya panen 5,1 ton per hektar tetapi sejak menggunakan Bioton mampu 9,7 ton rata-rata per hektar. Lahan saya pernah dikunjungi Bupati, wawancara wartawan cetak maupun televisi. Kalau menggunakan Bioton biasanya tanaman jauh lebih tinggi, daun lebar dan lemas, serta warnanya hijau segar, mungkin itu penyebab utama hasil bisa meningkat drastis.
11	Nagasari-Boyolali	Padi Membramo	Hasil sebelum menggunakan Bioton berkisar 7 ton per Hektar, setelah menggunakan Bioton setengah tidak percaya sebelumnya ternyata mampu diperoleh hasil 14,6 ton per hektar. Kemudian lahan saya digunakan untuk lomba supra insus tingkat nasional.
12.	Gajah-Demak	Padi IR-64	Setelah menggunakan Bioton terasa sekali hasilnya, karena benar-benar bisa meningkatkan panen dengan aman. Baru kali ini ada PPC yang sanggup meningkatkan hasil secara nyata cukup besar. Hasil panen setelah menggunakan Bioton 14,41 ton per hektar. Bulir padi "mentes", jumlah kerontokan lebih sedikit, rendemen rendah.
1.	Mahasiswa FP UNDIP	Ayam Pedaging 100 ekor	Ayam meningkat nafsu makannya, dan pada 3 (tiga) hari terakhir kehabisan pakan Bioton tidak beracun untuk ternak dan ada indikasi positif dengan menggunakan Bioton
2.	Gunung Pati Semarang	Sapi PFH Pejantan (penggemukan)	Hijauan yang diberikan selalu habis, nafsu makan meningkat, bobot badan sapi cepat meningkat. Bioton dapat digunakan sebagai semacam obat penambah nafsu makan
3.	Dukuhseti, Kab. Pati	Sapi Brahma (penggemukan)	Sapi tidak mau mengkonsumsi komboran karena bau. Penggunaan Bioton dg dicampurkan pada komboran perlu dilakukan adaptasi terlebih dahulu.

4.	Klaten	Ayam broiler (Kemitraan CP)	memberikan efek positif terhadap bobot tetapi agar dilakukan perhitungan yang matang dalam pemberian pakan karena penggunaan Bioton merangsang nafsu makan yang tinggi
5.	FP UNDIP Semarang	Ayam Broiler	Penggunaan Bioton pada air minum mengakibatkan bobot badan akhir ayam lebih tinggi dibanding tanpa Bioton. Penambahan Bioton secara ekonomis lebih menguntungkan pada dosis 0.5% Penggunaan Bioton mampu memberikan efek positif terhadap bobot badan ayam
6.	Magelang	Bebek	Aplikasi Bioton menunjukkan bahwa pertumbuhan bebek/itik relatif lebih cepat, daya rangsang makanan jadi besar, ketahanan tubuh meningkat, kalau malam cenderung tenang karena kenyang.